


Avertissements agricoles



BULLETIN PÉRIODIQUE DE LA STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES DE
BOURGOGNE ET FRANCHE-COMTÉ

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
Z.I. NORD - B.P. 194 - 21206 BEAUNE CÉDEX

ABONNEMENT ANNUEL 95 Frs Régisseur Recettes O.D.A. CCP DUJON 3405 12 K



☎ (80)22.19.38

ÉDITION GRANDES CULTURES

Bulletin n° 25 - 17 octobre 1984

COLZA

La végétation évolue lentement. De nombreuses parcelles sont au stade 3-5 feuilles vraies, mais avec un développement foliaire limité. (Dans quelques situations de semis tardifs, des parcelles sont plus en retard : stade 1-2 feuilles vraies).

ALTISES :

- L'ensemble des parcelles a dépassé le stade de sensibilité aux morsures : seuls les secteurs très en retard doivent encore être surveillés.
- Dans les secteurs où le charançon du bourgeon terminal est peu présent ; JURA, SAONE-ET-LOIRE, Val de Saône en COTE-D'OR :
 - . N'envisager un traitement insecticide que si des captures répétées d'altises (même faibles), sont notées sur la parcelle, ou à proximité. Le but de cette application est d'empêcher les pontes, donc la présence de larves pendant la période hivernale.
 - . En l'absence de captures d'altises, attendre le prochain bulletin qui fera le point sur les prochains piégeages de charançon du bourgeon terminal.

CHARANCON DU BOURGEON TERMINAL :

- 1^{ER} PIC DE VOL DU 8 AU 15/10
- PÉRIODE POSSIBLE DE TRAITEMENT : JUSQU'AU 25/10 ENVIRON.

SITUATION :

- Les premières captures d'adultes de charançon du bourgeon terminal sont enregistrées dans un certain nombre de postes de piégeage (1 poste sur 4) ; Ceux-ci sont répartis DANS TOUTES LES PETITES REGIONS HABITUELLEMENT CONCERNEES PAR CE RAVAGEUR (YONNE, NIEVRE, HAUTE-SAONE, COTE-D'OR sauf Val de Saône).
- Il est fort probable qu'un deuxième pic de vol plus important succède à celui-ci
- De nombreuses parcelles n'ont pas reçu de traitement insecticide contre les altises.

STRATEGIE GENERALE DE LUTTE :

- Empêcher les dégâts dus aux larves, en détruisant les adultes avant qu'ils ne pondent.
- Utiliser des spécialités du type pyréthrinoloïde à la dose autorisée contre les adultes d'altises (voir bulletin n° 21 du 7/9/84)

PRECONISATIONS :

- Dans les SECTEURS HABITUELLEMENT CONCERNES PAR CE RAVAGEUR, LA PERIODE POSSIBLE D'INTERVENTION VA : JUSQU'AU 25/10 ENVIRON.

Tenir compte des contraintes de travail rencontrées sur l'exploitation.

L'efficacité du traitement est la même pendant toute cette période.

REPONDEURS TELEPHONIQUES

Informations sur l'évolution des cultures, des maladies, des ravageurs

. BEAUNE : (80) 24.64.21 Côte-d'Or, Jura, Saône-et-Loire

*. AUXERRE : (86) 46.51.51 Yonne

*. VESOUL : (84) 93.88.88 Haute-Saône

* répondeur dans les locaux des Chambres d'Agriculture

CÉRÉALES

- SEMEZ LE PLUS TÔT POSSIBLE
- ATTENTION PUCERONS SUR CÉRÉALES LEVÉES.

PUCERONS ET JAUNISSE NANISANTE

Depuis le 10 octobre on peut constater le départ des pucerons (*Rhopalosiphum padi*) des maïs et des repousses d'orge vers les jeunes levées (encore rares) d'orge ou de blé.

La décision d'intervention ne peut s'envisager qu'au niveau de chaque parcelle (les secteurs abrités présentent des risques accrus). Une application insecticide est vivement conseillée dès que 10 % au moins des jeunes pieds sont porteurs de pucerons ce qui est parfois le cas actuellement (Yonne, Jura, Côte-d'Or, Haute-Saône).

CHOIX DES APHICIDES

Matières actives	Spécialités	Firmes	Dose/hectare
bromophos	<i>Sovi Nexion 25 EM</i>	SOVILO	1,5 l.
	<i>Rhodianex</i>	RHODIAGRI	1,5 l.
cyperméthrine	<i>Cymbush</i>	SOPRA	0,2 l.
	<i>Kafil Super</i>	LA QUINOLEINE	0,2 l.
	<i>Sherpa 10</i>	RHONE POULENC	0,2 l.
deltaméthrine	<i>Décis</i>	PROCIDA	0,3 l.
fenvalérate	<i>Sumicidin 10</i>	AGRISHELL	0,25 l.
perméthrine	<i>Ambush</i>	LA QUINOLEINE	0,2 l.

DESHERBAGE

Le Trapan (linuron + pendiméthalin) peut aussi s'utiliser sur seigle et présente une bonne efficacité sur pensée sauvage.